

Neue Optionen in der HCV Behandlung: Was bedeutet das für substituierte Patienten?

PD Dr. Markus Backmund

Praxiszentrum im Tal, LMU München

1. Vorsitzender der DGS




Hepatitis C und IDUs

- Nach Überwindung der Diskriminierung... nun die Frage, ob die komplizierte Tripletherapie funktioniert.

Herausforderungen durch die Tripletherapie

- Koppelung der drei Medikamente an Substitutionsmittelgabe nicht möglich
- Essen zur Einnahme kostet Geld
- Nebenwirkungen

Primary endpoint: SVR12



- T12(bid)/PR was non-inferior to T12(q8h)/PR for SVR12
 - Difference (95% CI): 1.5% (-4.9%, 12%)

Erste Ergebnisse PIT

	Boceprevir	Telaprevir	Beide
Weiblich	3 (37,5%)	2 (16,7%)	5 (25%)
Genotyp 1b	1 (12,5%)	3 (25%)	4 (20%)
Infektionsweg i.v.	8 (100%)	12 (100%)	20 (100%)
Substitutionsbeh.	4 (50%)	8 (66,7%)	12 (60%)
Viruslast < 800000	4 (50%)	6 (50%)	10 (50%)
Woche 4 / 8 negativ	4 (50%)	4 (20%)	8 (40%)
Woche 4 / 8 < 15	2 (25%)	5 (41,7%)	7 (35%)
Wo 4 neg. oder < 15	6 (75%)	9 (75%)	15 (75%)
Wo 12 (5 erst Wo 8)	3 (37,5%; 6:75%)	9 (75%;11:91,7%)	12 (60%;17:85%)
Abbruch	2 (25%)	1 (8,33%)	3 (15%)
Wo 24 / 28 negativ	3 (37,5%)	9 (75%)	12 (60%)

Voraussetzung

- für Diagnostik und Therapie somatischer und psychischer Erkrankung ist die bei Opiatabhängigkeit als Therapieoption erster Wahl anerkannte Substitutionsbehandlung
- ...doch diese ist gefährdet



BtMG und BtMVV müssen geändert werden:

- Das Abstinenzparadigma entspricht nicht mehr dem wissenschaftlichen Standard.
- Die Strafandrohungen für die Überlassung eines Betäubungsmittels sind für palliativmedizinische Versorgung und substitutionsgestützter Behandlung opiatabhängiger zu revidieren.

Evidenced based Medicine



- Opiat-Abhängigkeit ist eine chronische, oft tödliche Krankheit
 - Kein moralischer oder selbstverschuldeter Defekt
- Opioid-Substitutions-Therapie (OST) ist ein Menschenrecht
 - Grundrecht auf bestmöglichen Gesundheitszustand
- OST ist Goldstandard
 - Evidenzbasierte, sehr effektive Behandlungsmethode

Die Substitutionsbehandlung ist effektiv und erfolgreich wie fast keine andere Therapie

- Verbesserung Lebensqualität
 - Demenz: „kein Durchbruch in Prävention und Therapie“ (BMFSFJ)
 - Diabetes: wesentliche Verbesserung möglich
 - MS: keine dauerhafte Verbesserung möglich
- Opiatabhängigkeit
 - Schnelle und dauerhafte Verbesserung möglich
 - in wenigen Fällen sogar Heilung (Abstinenz)
- «Eine analog wirksame somatisch-medizinische Behandlung würde das Prädikat SEHR GUT erhalten»



Suchtkongresse

- 4. – 6. Juli 2013: 14. Interdisziplinärer Kongress für Suchtmedizin in München



INHSU INTERNATIONAL NETWORK
ON HEPATITIS IN
SUBSTANCE USERS

3RD INTERNATIONAL SYMPOSIUM
ON HEPATITIS CARE IN SUBSTANCE USERS

5 - 6 SEPTEMBER 2013
MUNICH, GERMANY

EASL EUROPEAN
ASSOCIATION
FOR THE STUDY
OF THE LIVER | ENDORSED
EVENT

Vielen Dank

- Und bitte daran denken: Der AST möchte wachsen: AST e.V. - Aktion gegen die Diskriminierung suchtkranker Menschen - www.antistigma.de
- Bankverbindung: HypoVereinsbank
- Kontonummer: 658 771 809
- BLZ: 700 202 70
- Tragen Sie den Ast als Zeichen der Solidarität